

AMPLIGO

אמפליגו®

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן
+ קבוצת IRAC: 28 - משבשי פעילות של קולטני RYANODINE

שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחף (ש.ת.ר. ZC)

קוטל חרקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

Chlorantraniliprole (CTPR) + lambda-cyhalothrin	החומר הפעיל
שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחף המכיל	התוארית
100 גרם CTPR ו- 50 גרם למבדה-סייהלוטרין בליטר	
נמוכה	רעילות לאדם
גבוהה	מסיסות במים
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 11/הצ/4091	מס' הרשוי

כללי

אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים, האחד פירתרואיד (למבדה סייהלוטרין), בעל פעילות קטילה מהירה היעיל בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני (CTPR) הוא חומר פעיל חדש המצטיין בהדברת עשים, חיפושיות ותריפסים והינו בעל יכולת תנועה סיסטמית בקסילם. CTPR פעיל על דרגות הזחל השונות כולל הביצים. תוארית התכשיר קפסולרית, ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל, ומופחת למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס. התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר ללא חשש מכך. אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה (בהגמעה או דרך מערכת השקיה מנותקת אויר). בעת הריסוס יש לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.

שילובים

ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים, בהתאם לגידולים:

עגבניה - פיראט, מטרונום.

גזר - בראבו.

כרוביים - טלסטאר, מטרונום פריים.

גפן - דומארק, קנון.

מלפפון - מטרונום פריים, פיראט, דומארק, קוסמוס, סכיור, גלבן מנקוזב, דאקוניל.

אגוזי אדמה - בראבו, אטמי אקסטרה.

רימון - הרקולס.

חמנית - פריורי אקסטרה.



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') הריכוז (%)	המזיק	הגידול
3	20 ביישום להדברת טוטה יש לשלב עם מטרונום פריים 0.5% או EOS 0.5%	הליותיס, פלזיה, מנהרן החממות ⁽²⁾ , טוטה אבסולוטה, אגרוטיס ⁽³⁾	עגביה ⁽¹⁾
3	20	הליותיס, פלזיה, לפיגמה	חציל ⁽⁴⁾
3	20	לפיגמה, הליותיס, פרודניה	פלפל
10			פפריקה
3	20	מנהרן החממות	מלפפון, קישוא, מלון
3	20	עש לב הכרוב, עש הכרוב, תריפס הטבק, פרודניה, לפיגמה	כרוב (אדום, לבן), כרובית, ברוקולי, צנונית
3	20	פרודניה, לפיגמה	חסה
8	20	פרודניה, לפיגמה, אגרוטיס ⁽³⁾	תפוח אדמה
8	20	פרודניה, לפיגמה	בטטה
14	40 - 20	מלדרה, דופונציליה	בטטה ⁽⁵⁾
14	20	לפיגמה, פרודניה	גזר
30	20	תריפס הטבק, אגרוטיס ⁽³⁾	בצל
14	20	הליותיס, אגרוטיס ⁽³⁾	כותנה
30	20	מלדרה	אגוזי אדמה ⁽⁶⁾
30	20	הליותיס, אגרוטיס ⁽³⁾	חמניות ⁽⁷⁾
	10	תריסית ירוקה, תריסית הצלף	
7	20	הליותיס, נובר התירס האירופי, נובר הקנה המנוקד ⁽⁸⁾ , אגרוטיס ⁽³⁾	תירס מתוק, תירס מספוא
30	20	הליותיס, זבוב המנהרות	חימצה
40	0.02%	עש היסמין	זית
8	0.02%	עש האשכול	גפן
7	0.02%	אגרסיה, עש החרוב	שקד

הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') הריכוז (%)	יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)
אפרסק, נקטרינה, משמש	אנרסיה	0.02%	7
רימון	כחליל הרימון	0.02%	14
פרחים ⁽⁹⁾ : גיבסנית, ליזאנטוס, נורית, כלנית, נץ חלב, סולידגו	לפיגמה	20	-

הערות לטבלה

- (1) בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן 24 שעות לאחר הריסוס.
- (2) בעגבניות - להדברת מינהרן החממות, מומלץ לשלב עם מטרונם פריים 0.5%.
- (3) להדברת אגרוטיס יש ליישם בריסוס שטח מלא בסמוך להצצה. מומלץ להמטיר 15 קוב"ד/ בתוך 12 שעות מהיישום.
- (4) בחציל - יש ליישם עד 2 ריסוסים בעונה.
- (5) יש לרסס החל מ-2 - 3 שבועות לאחר שתילה במינון 20 סמ"ק/ד' כל שבועיים או במינון 40 סמ"ק/ד' כל 4 שבועות. מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית בקרקע. יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.
- (6) באגוזי אדמה - מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק, לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור. יש לשלב במעקובת הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר, כדי למנוע התפתחות/התבססות של עמידות.
- (7) להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה (15 ל"ד) וכיסוי מיטבי.
- (8) להדברת נובר הקנה המנוקד, מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
- (9) זני פרחים שניבדקו: **בבסנית** - מירבלה, מיליון סטאר, פרפקטה, ליזאנטוס - פרטי (ורוד), רוזיטה (לבן), קזבלנקה, נורית - פרנס מנדרין, נץ חלב - דוביום אורנג', סולידגו - גלורי.