

קבוצת FRAC: 11 - מעכבי תהליכי נשימה
+ קבוצת FRAC: M5 - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

תרכיז רחף

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע

Chlorothalonil + Azoxystrobin	החומר הפעיל
תרכיז רחף המכיל כלורתלוניל 400 גר/ל' + אזוקסיסטרובין 80 גר/ל'	התוארית
נמוכה	רעילות לאדם
בינונית	מסיסות במים
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 07/הצ/1918	מס' הרשוי

כללי

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורתלוניל שהינו מרכיב בעל פעילות מניעה רבת אתרים, עובדה האחראית להעדר עמידות למרכיב זה, ומרכיב טרנסלמינרי, אזוקסיסטרובין, בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילורנים. לשני המרכיבים בתכשיר טווח פעילות רחב ביותר נגד מגוון מחלות, שילובם מבטיח פעילות משופרת של מניעה והדברה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.

שילובים

ניתן לשלב קומודור עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתווית האריזה שלהם:

- תפוח אדמה** - טלסטאר.
- גזר** - אטברון.
- חימצה** - קנון 50, טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.
- אבטיח** - וורטימק.
- מלון** - דומארק (בריסוס בלבד).
- מלפפון** - סוויץ'.
- אגוזי אדמה** - טלסטאר.



הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	הריכוז (% בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד')	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים))
אפרסמון	כתמי עלים	-	0.15% (1)	90
תפוח אדמה	חלפת, כמשון	150-200 (2)	-	15
	ריזוקטוניה (מק-שורש)	250 סמ"ק ל 1000 מטר שורה	יישום בפס הזריעה (6)	60
גזר	חלפת הגזר, קמחון הגזר	100-200 (3)	-	15
שום	סטמפיליום, חלדון	200	-	15
בצל	סטמפיליום, כשותית	200	-	15
חימצה, אפונה	כתמי אסקוכיטה	150	-	16
סלרי	צרקוספורה	150	-	14
אבטיח	קמחון הדלועיים	100	-	15
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	200	-	3
	קמחון הדלועיים	100	-	
מלון	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	400 (4) בהגמעה	-	3
עגבניה	קמחונית, קמחון העגבניה, כמשון	150	0.15%	3
אגוזי אדמה	צרקוספורה	150	-	30
זית	עין הטווס	-	0.15% (5)	90
תפוח	רקבון חייוני (אלטרנריה אלטרנטה)	-	0.15% (7)	14

הערות לטבלה:

- (1) יש לרסס במהלך החנטה לפחות שני ריסוסים באינטרוול של שבועיים.
- (2) המינון בהתאם לגודל גוף הצמחים ולעוצמת המחלה.
- (3) מינון נמוך לטיפול מניעה, מינון גבוה לטיפול תגובה על מחלה קיימת.
- (4) טיפול ראשון 10-20 יום משתילה, טיפול עוקב לאחר 2-3 שבועות. טיפול קומודור אינו תחליף לחטוי קרקע. אין ליישם במצע מנותק או בעת שהגידול בעקה.
- יש להזריק את התכשיר מהול למערכת טפטוף מנותקת אויר. יש ליישם במשאבת דישון במהלך השקיית 2-4 קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוסף לשטיפת המערכת.
- (5) ריסוס ראשון באוקטובר, ריסוס שני בדצמבר. ריסוסים נוספים במידת הצורך בינואר ובמרץ.
- (6) יש ליישם במהלך הזריעה באמצעות 2-4 (או 1) מכוונות המורכבות על גבי המזרעה כאשר 2 (או 1) מכוונות לאחרין הזריעה לפני נפילת הפקעות ו-1 (או 1) מכוונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגדודית מחדש. נבדק ונמצא בטוח בזנים: וולור, אלפא, רזנה, רודאו, קוליברי, דיפלה, וולדי, סנטה.
- (7) לשימוש בזן פינק לידי בלבד. להדברה מושלמת של המחלה יש ליישם תכשירים מתאימים מקבוצות כימיות שונות כל 14 ימים החל מאמצע חודש אוגוסט. התכשיר מוגבל ליישום אחד בעונה.

