

CANON 50

קנון 50

קבוצת FRAC: 33 - מנגנון פעולה שאינו ידוע

תרכיז נוזלי

תכשיר סיסטמי להדברת כשותית במלפפון, מלון, בצל, חמצה, חסה, צמחי תבלין וגפן. להדברת ריקבון חום, ריקבון שורש וחלפת בהדרים, ריקבון שורש באבוקדו, ומללת (בוטריוספריה) באבוקדו, נקטרינה ואפרסק.

החומר הפעיל	חומצה זרחיתית
התוארית	תכשיר נוזלי המכיל 780 גרם מלח אשלגן זרחיתי בליטר (500 גרם חומצה זרחיתית בליטר)
רעילות לאדם	נמוכה
מסיסות במים	גבוהה
היצרן	לוכסמבורג תעשיות בע"מ
מס' הרשוי	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 97/הצ/1462

כללי

קנון הינו תכשיר בעל השפעה סיסטמית המכיל את היסודות אשלגן וזרחן. האניון הזרחיתי שבתכשיר, יעיל במניעה והדברה של מחלות צמחים באמצעות פגיעה ישירה בפטריה והגברת תנגודת הצמח למחלה. התכשיר אינו רעיל למשתמש ולסביבה, אינו מלכלך את הפרי ומותר בשימוש עד ליום הקטיף. להשגת תוצאות מירביות בהדברת המחלות המפורטות בתוית יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת המחלה או עם ראשית הנגיעות. למניעת כשותיות, וכפועל יוצא ממנגנון הפעולה של קנון, מומלץ ליישם לפחות 2-3 ריסוסים ברצף. להדברת שאר המחלות יש לעקוב בקפידה אחר הוראות התוית.

הערות כלליות

אין לעלות במינון התכשיר מעבר למומלץ מחשש לצריכות בעלווה. אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה, או בתנאי מזג אויר קשים כגון טמפרטורות גבוהות, חמסין או קרה.



הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים)	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול
למניעת הדבקה יש לטפל במשתלה או בשדה שני טיפולים בריכוז המומלץ במרווח של כ- 10 ימים. ריסוס ראשון לפחות 3 ימים לפני ארוע הדבקה חזוי.	3	0.5	-	כתמי עלים (קסנטומונס וסיקטוריה)	פלפל
ריסוסי מניעה במרווחים של 7-14 יום, בנפח תרסיס של 20-40 ל"ד'.	3	-	350	כשויתית החסה	חסה
ריסוסי מניעה - 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע. נפח תרסיס 40-100 ל"ד' (ולא יותר) בהתאם לגודל הצמחים. ריסוס ראשון לאחר חודש משתלה.	3	-	350	כשויתית הדלועים	מלפפון בשדה פתוח ובגידול חסוי, מלון
יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת מחלה, 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע.	3	-	350	כשויתית הבצל והשום	בצל
המינון בהתאם לעוצמת המחלה ומשך ההדברה הנדרש.	3	-	350-250	כשויתית	חמצה
מיועד למניעת כשויתית בעלוה. בתקופה הרגישה יש לרסס לפני הופעת המחלה, לפחות 3 פעמים בתדירות של 7-10 ימים.	3	0.3	-	כשויתית הגפן	גפן
מיועד לריסוס מניעה בפרדס בתחילת עונת הגשמים.	3	0.25	-	רקבון חום (2)	הדרים (1)
למניעת הדבקה אביבית יש לרסס בסיום הפריחה, וכל שלושה שבועות עד חודש לאחר מכן בהתאם לעוצמת הנגיעות, עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס מידי שלושה או ארבעה שבועות החל מראשית חודש ספטמבר.	3	0.25	-	כתמי חלפת (אלטרנריה) בפרי (3)	
מיועד לטיפול מניעה. המינון מתאים לשקית גידול בת 8 ליטר. אין לטפל לפני או אחרי גיזומים דרסטיים של עלוות השתילים.	-	-	5 סמ"ק לשתיל	ריקבון צוואר השורש (פיטופטורה)	משתלות הדרים (4)



הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים))	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול
-	3	-	בהזרקה לגזע 7.5 סמ"ק לכל 1 מטר של קוטר נוף העץ	ריקבון השורש (פיטופטורה)	אבוקדו ⁽⁵⁾
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים	3	1.5 ליטר לדונם בהגמעה (6) + ריסוס בריכוז 0.5% עם משטח L-77 בריכוז 0.025%		מללת (בוטריוספריה)	אבוקדו צעיר (עד 3 שנים מנטיעה)
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים	3	1.5 ליטר לדונם בהגמעה (6)		מללת (בוטריוספריה)	אבוקדו בוגר (מעל 3 שנים)
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים מתחילת לבלוב ועד השלכת	3	ריסוס נוף בריכוז 0.3%			נקטרינה, אפרסק
מיועד למניעת כשותית בעלוה. יש לרסס לפני הופעת המחלה, באינטרוול של 7-10 ימים.	3	-	350	כשותית	צמחי תבלין: פטרוזיליה, רוזמרין, נענע (מנטה), גד השדה (כוסברה), עירית, רוקולה (רוקט), ריחן (בזיל)



הערות לטבלה:

- (1) בפרדס אין לשלב עם כל תכשיר אחר. אסור לרסס אם ניתן או צפוי טיפול בשמן במרווח זמן של שלושה שבועות מיישום קנון.
- (2) יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה 1.5 מטר מן הקרקע, בנפח תרסיס של 150-200 ל"ד'.
- (3) הטיפול מוריד במידה ניכרת את הנגיעות בכתמי חלפת (אלטרנריה) בפרי אך אינו מונע את התופעה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא. ניתן ליישם לסירוגין עם תכשירים מורשים אחרים, בהתאם להמלצות משרד החקלאות.
- (4) ניתן ליישם בהנמעה עם 250 סמ"ק מים, או דרך מערכת הטיפטוף עם 400-500 סמ"ק מים לשתיל. יש לטפל רק כאשר מצע הגידול רטוב, (עדיף יום לאחר השקיה). הטיפול יעיל לפחות 40 יום ממועד היישום.
- (5) יש לטפל פעמיים בשנה בעת צימוח שורשים (לאחר סיום צימוח העלווה) במהלך חודש יוני וסוף אוגוסט. בכל מועד מומלץ לחזור על היישום פעם נוספת לאחר 10 ימים. בהזרקה - יש למהול 7.5 סמ"ק תכשיר לפי יחס של 1:1 במים ולהזריק לגזע. כל 7.5 סמ"ק תכשיר, יש להזריק בנפרד במקום אחר בגזע העץ (מומלץ להשתמש במזרק וטרינרי). לפני ביצוע הטיפול עדיף להתייעץ עם מדריך ש.ה.מ. או עם אחד מאנשי השדה של החברה.
- (6) יש להגמיע במהלך השליש השני של השקיה משקית. מומלץ להתייעץ עם אנשי החברה או גורמי ההדרכה.

שילובים

- מלפפון בחממה** - ניתן לשלב עם דומארק, מנקו-די, פיראט, ורטימק (ללא שמן), אופיר, באיפידן, סוויץ', מיתוס, רסק.
- מלפפון בשטח פתוח** - ניתן לשלב בנוסף לנ"ל גם עם טיטאן, קוצייד.
- מלון** - ניתן לשלב עם מנקו-די, גופריתר, דומארק, טלסטאר, מוספילן, ורטימק (ללא שמן).
- חמצה** - ניתן לשלב עם טלסטאר, אטמי אקסטרה, קומדור, פוליקור, סקור, עמיסטר.
- כרם** - ניתן לשלב עם דומארק, פוליקור, אופיר, דורסן, טיטאן.
- בזיל** - ניתן לשלב עם פולאר, פרוקליים, ורטימק, מטרונום.
- לפני ריסוס אחד השילובים הנ"ל קרא בעיון את תוית התכשיר המשולב ונהג לפי ההנחיות המופיעות בה.