

אוהיו OHAYO

תרכיז רחיף

קוטל מחלות בתפוז"א וגפן למניעת מחלות קרקע במלון ותפוז"א ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה

Fluazinam < החומר הפעיל

תרכיז רחיף המכיל 500 גרם חומר פעיל בליטר < התוארית

נמוכה < רעילות לאדם

נמוכה < מסיסות במים

ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, Japan < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 95/הצ/1382 < מס' הרשוי

כללי

אוהיו הינו קוטל מחלות מקבוצת הפירידיאמינים, הפועל ע"י עיכוב תהליך זירחון חימצוני בפתוגנים. התכשיר יעיל להדברת טווח רחב של מחלות, באמצעות מניעה יעילה של התפתחות המחלות. אוהיו פעיל על מספר אתרים שונים בפתוגנים ולכן הסיכוי להתפתחות תנגודת לתכשיר הינו מינימלי.



אוהיו OHAYO

הוראות שימוש

הערות	טיפול עלווה - כמות תכשיר		המחלה	הגידול
	ריסוס עד נגירה (ריכוז %)	נפח תרסיס 20-40 ליטר/ד' מינון (סמ"ק/ד')		
מטפלים החל מהצצה ולפני הופעת המחלה מידי 7-12 יום בהתאם לקצב הגידול והנגיעות (2)	-	50	כמשון (1)	תפוחי-אדמה
טיפול מניעה בסוף העונה מידי 7-14 יום. (בבוטריטיס-במיוחד אם צפויים גשמים). הטיפולים ימנעו גם התפתחות רקבונות במהלך האיחסון.	0.1%	-	בוטריטיס (4)	גפן (3)
	0.1%-לטיפול מניעה, לפני הופעת נגיעות. 0.15%-לטיפול עם תחילת נגיעות וכאשר קיימת סבירות גבוהה לנגיעות	-	אספרגילוס, ריזופוס	
יש לרסס חודש לפני בלבול צפוי, לאחר זמירה. מומלץ להשלים בשני ריסוסי מנכו-די, ראשון בראשית בלבול ושני 10 ימים לאחר מכן.	0.1% בתוספת 2% שמן מינרלי (אד-קוי, אולטרה פיין)	-	זרוע מתה	
מוהלים את התכשיר ומגמיעים לפי 0.5-1.0 ליטר/צמח. מיישמים החל משבועיים לאחר שתילה או זריעה ולאחר מכן במרווחים של שבועיים, עד לקטיפ.	150 סמ"ק/ד' בהגמעה		מונוספוראסקוס (התמוטטות מאוחרת במלונים)	מלון (5) טיפולי קרקע
ריסוס בפס הזריעה, בנפח תרסיס 20 ל"ד'. יש ליישם בשתי דיוות קונג'ט, רוחב פס 30 ס"מ, דיוה ראשונה לאחר פתיחת התלם ושניה על מקום נפילת הפקעות.	500 סמ"ק/ד' ריסוס בפס הזריעה		ריזוקטוניה (6)	תפוחי-אדמה טיפולי קרקע
נפח תרסיס 5 סמ"ק לק"ג זרעים בצפיפות כסוי של כ- 1,200 טיפות/סמ"ד.	טיפול זרעים		אספרגילוס, ריזופוס	טיפול בזרעי אגוזי-אדמה, בזנים נועם, עודד, שולמית
	טיפול זרעים - ריסוס ULV (בנפח נמוך מאוד) בריכוז 2%.			



אוהיו OHAYO

הערות לטבלה:

- (1) טיפולים למניעת כמשון, ימנעו גם חלפת.
- (2) מטפלים החל מהצצה ובעיקר לפני סגירת השורות ולפני הופעת המחלה בתדירות של 12 ימים. עם הופעת המחלה או עליה בקצב הצימוח מצופפים לטיפול כל 7 ימים.
- (3) כרם בזנים: סוביניון לבן, שאנן, פרנץ' קולומבר, קברנה, מוסקט, סולטנינה (תומפסון), שרדונה, ברלינקה ושמי (חברוני).
- (4) טיפולים בסוף העונה למניעת בוטריטיס יפחיתו התפתחות כשותית אך לא ידבירו כשותית קיימת.
- (5) במלונים לפני היישום יש להרטיב קרקע ב- 2/3 מכמות השקיה רגילה ולאחריו להשלים את השליש הנתר. יישום אוהיו אינו חלופה לשיטות הדברה חלופיות (מתיל ברומיד, כנות עמידות) ומומלץ ליישמו בשילוב עם שיטות אלה.
- (6) יעילות מניעת התפתחות קשיונות הריזוקטוניה הינה עד שבועיים ממועד ייבוש העלוה.

שילובים

- בתפוחי אדמה - בריסוסי עלווה ניתן לשלב אוהיו עם טלסטאר, מרשל וסנדוקור בהתאם למינונים המופיעים בתווית של כל תכשיר.
- בכרם - ניתן לשלב אוהיו עם קנון, דיויפאן וטרייסר.

