

# אמינובר AMINOBAR

אבקה מסיסה בשקיות מסיסות  
קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה, בשיבולת שועל, במטע ובשטחי בור

Dimethylamine salt of 2,4-D ..... < החומר הפעיל

אבקה מסיסה המכילה 96.9% חומר פעיל ..... < התוארית

נמוכה ..... < רעילות לאדם

גבוהה ..... < מסיסות במים

Nufarm, Australia ..... < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 01/הצ/1643 ..... < מס' הרשוי

## כללי

אמינובר הינו קוטל עשבים בררני, סיסטמי, מקבוצת תרכובות הפנוקסי ומיועד להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה ובשיבולת שועל, במטעים ובשטחי בור. התכשיר נקלט ע"י כל חלקי הצמח, פועל בדומה לאוקסינים ופוגע בתהליכים רבים בצמח.

אמינובר ארוז בשקית אלומיניום ובה שקית פנימית נוספת מסיסה אותה ניתן להכניס עם התכשיר למיכל המרסס.

## הדברת עשבים:

התכשיר מדביר עשבים רחבי-עלים חד-שנתיים ממשפחות שונות כגון: מצליבים, סילקיים, מורכבים ועוד. אמינובר מסייע בקטילת עשבים קשי הדברה במטעים ובשטחי בור כאשר הוא משולב עם גלייפוס.



# אמינובר AMINOBAR

## הוראות שימוש בגידולים דגניים

מועד הריסוס	נפח תרסיס (ל"ד')	מינון (גר/ד')	הגידול
עם סיום התמינות השיבולת (לאחר הופעת 6 עלים והתארכות פרק ראשון) ועד לשבועיים לפני השתבלות <sup>(4)</sup>	מהקרקע- 15-25 מהאוויר- 3-5 <sup>(3)</sup>	90	חיטה <sup>(1)</sup> שיבולת שועל <sup>(2,1)</sup>

### הערות לטבלה:

- (1) אין להכניס בעלי חיים לשטח המרוסס במשך 7 ימים. אין לרסס חיטה ושיבולת שועל במצב עקה. עקת יובש לפני ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס עתודות המים בקרקע צריכות להספיק ל-3 שבועות.
- (2) שבולת שועל לשחת בלבד מן הזנים סאיה 4, סאיה 6.
- (3) ריסוס אוירי מותנה באישור השרותים להגנת הצומח ולביקורת.
- (4) סימן המדויק ביותר לקביעת מועד הריסוס המוקדם ביותר הוא סיום התמינות השיבולת. ניתן לזהות זאת באמצעות חתך אורך בבסיס הצמח. יש להמנע מריסוס מוקדם מדי, בייחוד בזנים אפילים כגון אריאל. בשיבולת שועל יש להקפיד שגם הסעיפים הצעירים ביותר בני 6 עלים.

**הערה:** אין לשלב עם דשן אוראן מחשש להתגבשות.

## הוראות שימוש במטע ושטחי בור

הערות	עשבים מודברים	נפח תרסיס	רכוז/מינון	גידול
יש להקפיד ולרסס בתנאים נאותים של העדר רוח וטמפרטורות מתונות. המנע מפגיעת תרסיס בחלקי הצמח הירוקים כולל סורים (חזירים). המנע מריסוס בעת הפריחה. הזהר מפגיעה בגידולים שכנים.	חד רוב שנתיים, חורפיים וקיציים.	30 ל"ד' בריסוס באמצעות מוט ריסוס. עד הרטבה מלאה באמצעות רובים או מרססי גב	0.25% בשילוב עם גלייפוס 1%	הדרים, נקטרינה, אפרסק, זיף, שקד, תפוח, מנגו, זית, רימון, אבוקדו, משנה שלישית לנטיעה
כשהגידול בגובה 30-40 ס"מ בריסוס מכוון ומוגן ומתחת לנוף הגידול	עשבי קיץ רחבי עלים	20-30 ל"ד'	ריסוס מכוון ומוגן <sup>(1)</sup> במינון 120 גר/ד'	סורגום
יש לרסס בתנאים של העדר רוח ולהזהר מפגיעה בגידולים חקלאיים סמוכים.	חד רוב שנתיים, חורפיים וקיציים.	30 ל"ד' ומעלה, כדרוש לכיסוי מיטבי של העשביה,	0.25%-0.5% <sup>(2)</sup> בשילוב עם גלייפוס 1%-3%	שטחי בור וציד דרכים

### הערות לטבלה:

- (1) מוגן - הגנה על הסורגום מפני רחף של התכשיר באמצעות מגינים על הפומיות או על הגידול.
- (2) הריכוז יקבע בהתאם למגוון וגובה העשבים.

