

דומארק קומבי DOMARK COMBI

אבקה רחיפה בשקיות מסיסות
קוטל מחלות בירקות, גידולי שדה, מטע, פרחים ותבלינים

Tetraconazole + Sulfur < החומר הפעיל

אבקה רחיפה המכילה 1% טטראקונזול + 40% גופרית < התוארית

נמוכה < רעילות לאדם

נמוכה < מסיסות במים

Isagro, Italy < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 01/הצ/1656 < מס' הרשוי

כללי

דומארק קומבי הינו תכשיר המכיל תערובת של קוטל סיסטמי וקוטל מגע. תערובת זו מאפשרת לתכשיר פעילות מניעה ופעילות מגע. התערובת מפחיתה את סכנת פיתוח העמידות ומתאימה ליישום בתוכנית הדברה משולבת.



דומארק קומבי DOMARK COMBI

הוראות שימוש

הגידול	המחלה	ריכוז (%) (מינון גר/ד')	נפח תרסיס (ל'ד')	ימים מקטיף	הערות
עגבניה	קימחונית	400	40-20	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה
מלון	קימחון	300	100-40	3	יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה
אבטיח	קימחון	300	40-20	3	
קישוא	קימחון	450-300	100-40	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות
תות שדה	קימחון	500-300	100-70	3	יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות
מנגו	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש לרסס עד נגירה, תוך הקפדה על כיסוי התפרחות
כרם	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש להקפיד על כיסוי מלא של האשכולות
אפרסק, נקטרינה	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה
גפסנית	קימחון	300	עד נגירה	-	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה
כוסברה	קימחון	300	40-20	14	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה

הערה

אין לרסס דומארק קומבי בימי שרב או בשעות החום בימי הקיץ, כאשר הטמפרטורה עולה על 30°C.

שילובים

במידה ומשלבים תכשיר נוסף, יש להוסיפו לאחר הכנת תמיסת הריסוס של דומארק קומבי ובהתאם להוראות השימוש המופיעות על התווית שלו:

אבטיח: מרשל, ורטימק, מוליט, מוספילן, ספיידר, אויסקט.

מלון: קנון, מנקו-די, טרימנגול, טלסטאר, מרשל, ורטימק, אויסקט, מוספילן, ספיידר.

כרם: דורסן, דיויפאן.

תות שדה: אטברון, פליקטרן, ורטימק, טרייסר, פלינט, פולאר, מיתוס.

