

# דורסן® DORSAN

תרכיז מתחלב  
להדברת מגוון גדול של מזיקים בגידולים חקלאיים רבים

Chlorpyrifos ..... < החומר הפעיל

תרכיז מתחלב המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר ..... < התוארית

גבוהה ..... < רעילות לאדם

גבוהה ..... < נדיפות

לוכסמבורג תעשיות בע"מ ..... < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת וז/הצ/40 ..... < מס' הרשוי

## כללי

דורסן הינו קוטל חרקים זרחן-אורגני יעיל בהדברת מספר רב של מזיקים בגידולים חקלאיים שונים. על מנת להשיג תוצאות הדברה מקסימליות יש להשתמש בדורסן בדיוק כמתואר בהוראות השימוש.



# DORSAN דורסן

## הוראות שימוש

| מועד אחרון לפני האסיף או הקטיף | ריכוז (%) | מינון (סמ"ק/ד') | המזיק                                | הגידול                                     |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 21 יום לפני הקטיף              | -         | 250-200         | פרודניה                              | כותנה                                      |
| 5 ימים לפני הקטיף או האסיף     | -         | 200-150         | פלזויה, פרודניה                      | עגבניה, פלפל, תפוז"א                       |
| 7 ימים לפני הקטיף              | -         | 200-150         | פרודניה                              | קינרס                                      |
| 7 ימים לפני האסיף              | -         | 200-150         | פרודניה, עש לב הסלק                  | סלק סוכר, סלק מספוא                        |
| 7 ימים לפני הקציר              | -         | 200-150         | פרודניה                              | אספסת                                      |
| 7 ימים לפני הקציר              | -         | 200             | פרודניה                              | תירס מתוק, תירס מספוא                      |
| 7 ימים לפני הקציר              | -         | 200-150         | לפיגמה, תולעת הגדוד האמיתית          | וידן ורודוס                                |
| 7 ימים לפני הקטיף              | 0.15      | -               | פרודניה, סס הנמר, עש התפוח           | תפוחי עץ, אגסים                            |
| 60 יום לפני הקטיף              | 0.15      | -               | כנימה קימחית                         | אפרסמון                                    |
| 7 ימים לפני הבציר              | 0.15-0.1  | -               | עש האשכול, זבוב התסיסה, כנימה קימחית | גפנים <sup>(1)</sup>                       |
|                                | 0.15      | -               | פרודניה                              |  |
| 30 יום לפני הקטיף              | 0.1       | -               | כנימה קימחית חבויה, כנימת המוץ       | הדרים <sup>(2)</sup>                       |
| אמצע יולי                      | 0.3       | -               | כנימה קימחית של ההדר                 | הדרים <sup>(3)</sup>                       |
| -                              | 0.15      | -               | פרודניה                              | משתלות הדרים                               |
| 60 יום לפני הקטיף              | 0.15      | -               | עש התמר הקטן, חיפושית הגרעין         | תמר  |
| -                              | -         | 150             | פרודניה                              | ציפורן, חרצית <sup>(4)</sup>               |
| -                              | -         | 150             | פרודניה                              | גיפסנית, אסתר, דגנית, כלנית <sup>(4)</sup> |



## DORSAN דורסן

### הערות לטבלה:

- (1) השימוש בדורסן בגפנים אסור לפני ה- 15 ביוני מחשש לפגיעה בעלווה. סימפטומים קלים על העלווה אפשריים גם לאחר תאריך זה. אין להשתמש בדורסן במשתלות גפן. הריכוז הנמוך מומלץ כאשר הנגיעות נמוכה וההדברה סדירה.
- (2) בפרדס בריסוס נגד כנימות יש ליישם בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מירבי. אין לשלב עם שמן.
- (3) ריסוס בריכוז 0.3% יבוצע פעם בעונה. יישום במפוח יש לבצע בנפח תרסיס מינימלי של 400 ל"ד'.
- (4) אין לרסס ריסוסים עוקבים בגידולי פרחים.

### שילובים

ניתן לשלב דורסן עם מרבית קוטלי החרקים והפטוריות הנמצאים בשימוש בחקלאות, אך אין לשלב עם תכשירים בסיסיים כמו גפרית, מרק קליפורני ותכשיר בדיל. בגפנים אין לשלב דורסן עם מרפאן.

