

# טיטאן 20™ TITAN 20

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

< החומר הפעיל ..... Cypermethrin

< התוארית ..... תרכיז מתחלב המכיל 200 גרם חומר פעיל בליטר

< רעילות לאדם ..... בינונית

< מסיסות במים ..... נמוכה

< היצרן ..... לוכסמבורג תעשיות בע"מ

< מס' הרשוי ..... רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 81/הצ/428

## כללי

טיטאן 20 הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירותרניים הסינתטיים, הפועל כרעל מגע וכרעל קיבה.



# טיטאן 20 TITAN 20

## הוראות שימוש

ניתן לרסס את התכשיר בריסוס איירי ובציוד קרקע, בריסוס גיריה או בנפח קטן. היות ולתכשיר לחץ אדים נמוך ואינו מוסע ברקמות הצמחים, יש להקפיד על הבאת התרסיס לאתר פעילות המזיק.

ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	כמות התכשיר		המזיק	הגידול
	ריכוז (%)	מינון (סמ"ק/ד')		
-	-	75	זחלי פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק, זחל וורוד. יודברו גם זחלי הליותיס וזחל ההלקט הזיפי	כותנה
30	-	75-50 <sup>(1)</sup>	חיפושית פרעושית נחושתית, עש הקמה, כנימת עלה הדגן	חיטה <sup>(1)</sup>
		50	פשפש הקמה	
30	-	75-50	כנימת עלה הדגן	שעורה <sup>(1)</sup>
21	0.05	-	ציקדות, זיבל הפרחים. הריסוס נגד זיבל הפרחים יינתן בשעות הערב בלבד	אפרסק, משמש, שקד
21	0.05	-	פרודניה, ציקדות	תפוח
21	0.05	-	זבוב התסיסה, עש האשכול	גפן
21	-	75-50 סמ"ק בריסוס אייר. 50-30 סמ"ק בריסוס קרקע	פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	תפוח אדמה, גזר
14	0.15%, בנפח תרסיס 20-50 ל"ד', כנדרש לכסוי מלא של נוף הצמחים <sup>(2)</sup>	-	הדברת כנימת עש הטבק - למניעת העברה של יורוס צהבון האמיר	עגבניה
14	-	50-30	פרודניה	עגבניה, כרפס, כרוב, סלק כרובית, אדום
21	-	50	תריפס הטבק	בצל, שום



## טיטאן 20 TITAN 20

## הוראות שימוש

ריסוס אחרון לפני הקטיפי (ימים)	כמות התכשיר		המזיק	הגידול
	ריכוז (%)	מינון (סמ"ק/ד')		
14	-	50	בוגרי כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	מלפפון, מילון- בשדות גלויים בלבד
14	-	50-30 סמ"ק לפי גודל הצמחים	פרודניה, תריפס הטבק, בוגרי כנימת עש הטבק	חציל, פלפל, קישוא
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, זיבל הפרחים	עדעד, צפורן
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	גרברה
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה	ליאטריס
-	-	50	תריפס קליפורני	רוסקוס

## הערות לטבלה

(1) ניתן ליישם בריסוס אוירי, בנפח 3-5 ל"ד'. המינון בהתאם לנגישות הקיימת.

(2) בחלקות המציצות בעונה בה יש חשש להעברת הווירוס, מרססים מהצצת הנבטים הראשונים ועד שבועיים לאחר ההצצה מדי שני ימים. בחלקות שתולות מטפלים מיום השתילה, ואם הן מומטרות, חוזרים על הטיפול מיד לאחר כל המטרת קליטה. משבועיים לאחר הצצה או שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מדי שלושה ימים.

## שילובים

בחיטה - אטמי אקסטרה, אמינובר.

בעגבניות לתעשייה - מנקו די, מטיון משולב.

במלון - קנון, מטיון משולב.

בכרוב - אטברון.

בפלפל - גופריתר.

במלפפון - קנון, דומארק, מנקו די.

