

קומודור® COMODOR

תרכיז רחיף

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע

Chlorothalonil + Azoxystrobin < **החומר הפעיל**

תרכיז רחיף המכיל כלורתלוניל 400 גר'/ל' +
אזוקסיסטרובין 80 גר'/ל' < **התוארית**

נמוכה < **רעילות לאדם**

בינונית < **מסיסות במים**

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland < **היצרן**

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 07/הצ/1918 < **מס' הרשוי**

כללי

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורתלוניל שהינו מרכיב בעל פעילות מניעה רבת אתרים, עובדה האחראית להעדר עמידות למרכיב זה, ומרכיב טרנסלמינרי, אזוקסיסטרובין, בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילינים. לשני המרכיבים בתכשיר טווח פעילות רחב ביותר נגד מגוון מחלות, שילובם מבטיח פעילות משופרת של מניעה והדברה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.

שילובים

ניתן לשלב קומודור עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתוויות האריזה שלהם:

תפוז"א - טלסטאר

גזר - אטברון

שום - מרשל 25, אסטאר

בצל - מרשל 25, מרשל 48

חימצה - קנון, טלסטאר, פנטרה, תיונקס, דואל גולד

אבטיח - וורטימק

מילון - דומארק (בריסוס בלבד)

מלפפון - סוויץ'

אגוזי אדמה - טלסטאר



קומודור COMODOR

הוראות שימוש

ריסוס אחרון (לפני קטיף ימים)	ריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	המחלה	הגידול
90	0.15% ⁽¹⁾	-	כתמי עלים	אפרסמון
15	-	150-200 ⁽²⁾	חלפת וכימסון	תפוח אדמה
100	יישום בפס הזריעה ⁽⁶⁾	250 סמ"ק ל 1000 מטר שורה	ריזוקטוניה (מק שורש)	
15	-	100-200 ⁽³⁾	חלפת הגור וקימחון הגור	גזר
15	-	200	סטמפיליום, חילדון	שום
15	-	200	סטמפיליום וכשותית	בצל
16	-	150	כתמי אסקוכיטה	חימצה, אפונה
14	-	150	כתמת (צרקוספורה)	סלרי
15	-	100	קימחון הדלועיים	אבטיח
2	-	200	כשותית הדלועיים	מלפפון, מלון
	-	100	קימחון הדלועיים	
2	-	400 ⁽⁴⁾ בהגמעה	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	מלון
10	0.15%	150	קמחוניתי, קימחון העגבניה, כימסון	עגבניה
30	-	150	כתמת (צרקוספורה)	אגוזי אדמה
90	0.15% ⁽⁵⁾	-	עין הטווס	זית

הערה לטבלה:

- (1) יש לרסס במהלך החנטה לפחות שני ריסוסים, באינטרוול של שבועיים.
- (2) המינון בהתאם לגודל נוף הצמחים ולעוצמת המחלה.
- (3) מינון נמוך לטיפול מניעה, מינון גבוה לטיפול תגובה על מחלה קיימת.
- (4) טיפול ראשון 10-20 יום משתילה, טיפול עוקב לאחר 2-3 שבועות. טיפול קומודור אינו תחליף לחיטוי קרקע. אין ליישם במצע מנותק או בעת שהגידול בעקה.
- יש להזריק את התכשיר מהול למערכת טפטוף מנותקת אויר. יש ליישם במשאבת דישון במהלך השקיית 2-4 קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוסף לשטיפת המערכת.
- (5) ריסוס ראשון באוקטובר, ריסוס שני בדצמבר. ריסוסים נוספים במידת הצורך בינואר ובמרץ.
- (6) יש ליישם במהלך הזריעה באמצעות 4 (או 2) פומיות המורכבות על גבי המזרעה כאשר 2 (או 1) מכוונות לחריץ הזריעה לפני נפילת הפקעות ו-2 (או 1) מכוונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגדודית מחדש. נבדק ונמצא בטוח בזנים: וולור, אלפא, רוזנה, רודאו, קוליברי, דיפלה, וולדי, סנטה.

