

# ראגבי סופר® RUGBY SUPER

תרחיף קפסולות  
קוטל נמטודות ומזיקי קרקע בירקות, תבלינים, פרחים, מטעים וגידולי שדה

החומר הפעיל < Cadusafos .....

התוארית < תרחיף קפסולות המכיל 200 גרם חומר פעיל בליטר .....

רעילות לאדם < בינונית .....

מסיסות במים < נמוכה .....

היצרן < FMC, U.S.A .....

מס' הרשוי < רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 02/הצ/1680 .....

## כללי

ראגבי סופר הינו קוטל נמטודות מקבוצת הזרחנים האורגניים הפועל כרעל מגע על מגוון גדול של נמטודות ומזיקי קרקע. בתכשיר המרוכז נמצא החומר הפעיל בתוך קפסולות, דבר המפחית משמעותית את רעילות התכשיר למשתמש בזמן הטיפול עם התכשיר, אך אינו מיועד לשחרור איטי של חומר פעיל בקרקע. ראגבי סופר מורשה ובטוח לשימוש במספר רב של גידולים, כמפורט בהוראות השימוש. התכשיר מתפרק באיטיות ואינו שטיף - תכונות המבטיחות משך פעילות ארוך. תנועתו של התכשיר בצמח מוגבלת ותכונה זו מאפשרת את יישומו במהלך הגידול.

כדי להבטיח את פיזורו והפעלתו בקרקע יש להקפיד על כל הוראות השימוש. כמו כל תכשיר המיושם בקרקע, חשוף ראגבי סופר להתפתחות תופעת "פירוק-מיקרוביאלי-מואץ". כדי למנוע התפתחות תופעה זו מומלץ לא לטפל ברציפות בראגבי סופר. התכשיר רעיל לדגים.



# ראגבי סופר RUGBY SUPER

## הוראות שימוש

יישום אחרון (לפני קטיף (ימים))	אופן היישום	מינון (ל/ד')	המזיק	הגידול
7	בתיחוח <sup>(1)</sup> : 10-15 יום לפני זריעה/שתילה. ריסוס ותיחוח לעומק 15-20 ס"מ והפעלה בהשקיה של 30 קוב/ד'. בהגמעה <sup>(2)</sup> : הגמעה מתחת לטפטפות 10-15 יום לפני זריעה/שתילה ו/או במהלך הגידול. הפעלה ע"י השקיה בטפטוף, ו-2 קוב לדונם.	1.5	נמטודה יוצרת עפצים	עגבניה (ראה הערה מס' 3) פלפל, חציל, מלפפון, קישוא, אבטיח, ארטישוק
30	יישום בהגמעה <sup>(2)</sup> מתחת לטפטפות והפעלה ע"י השקיה בטפטוף, ו-2 קוב לדונם.	1.5	נמטודה יוצרת עפצים	תבלינים: מרוה, רוזמרין עירית, בזיל
ללא הגבלה	בתיחוח <sup>(1)</sup> : 10-15 יום לפני זריעה/שתילה. ריסוס ותיחוח לעומק 15-20 ס"מ והפעלה בהשקיה של 30 קוב/ד'. בהגמעה <sup>(2)</sup> : הגמעה מתחת לטפטפות והפעלה ע"י השקיה בטפטוף, ו-2 קוב לדונם.	1.5	נמטודה יוצרת עפצים	פרחים <sup>(4)</sup> : היפיריקום, גרברה פרח-שעווה אסקלפיאס ליזיאנטוס סולידאגו טרכליום
21	לפני שתילה: ריסוס ותיחוח. לאחר הצצה: ריסוס והשקיה מיידית לשטיפה והצנעה של התכשיר.	1.5	דרני מלדרה מטרידה	בטטות
30	לפני זריעה: ריסוס ותיחוח. לאחר הצצה: ריסוס והשקיה מיידית לשטיפה והצנעה של התכשיר.	1.5	נמטודה יוצרת עפצים, נמטודת פראטילנכוס	תפוז"א
14	יישום בריסוס לאחר הצצה, השקיית הפעלה בת 15-30 קוב תוך שעה עד יממה מהיישום. במידה ומגלים נגיעות חוזרת ניתן ליישם שוב לאחר חודש.	1.5	אקרית הריזוגליפוס	בצל, שום
-	טבילה למשך 5 דקות. לאחר מכן יש לייבש את השננות ולזרוע תוך 5-1 ימים.	טבילת שננות בתמיסה מימית בריכוז 0.5%	נמטודת הגבעול והפקעת, אקרית הריזוגליפוס	חטוי שננות שום



# ראגבי סופר RUGBY SUPER

## הוראות שימוש

יישום אחרון (לפני קטיף ימים)	אופן היישום	מינון (ל'/ד')	המזיק	הגידול
60	בהגמעה מתחת לטפטוף או במערכות מנותקות לחלוטין ממערכת מי השתיה - יישום דרך הטפטוף. לפי חישוב של 20-30 סמ"ק לבית. המינון בהתאם לנגיעות <sup>(5)</sup> .	3-2	נמטודה סלילנית	בננות (במטע קיים)
30	בהגמעה מתחת לטיפטוף והפעלה ע"י השקיה בטפטוף של כ-2 קוב לדונם <sup>(5)</sup> .	1.5	נמטודה יוצרת עפצים	אפרסק, נקטרינה
30	בהגמעה מתחת לטיפטוף והפעלה ע"י השקיה בטפטוף של כ-2 קוב לדונם <sup>(5)</sup> .	1.5	נמטודה יוצרת עפצים, נמטודה סלילנית	כרם
30	בהגמעה מתחת לטיפטוף והפעלה ע"י השקיה בטפטוף של כ-2 קוב לדונם <sup>(5)</sup> .	1.5	נמטודת הדרים	פרדס
-	למהול לפחות ב 100 סמ"ק מים לשתיל ולהגמיע. אין ליישם לפני או אחרי גיזום דרסטי	2.5 סמ"ק לשקית גידול של 8 ליטר	נמטודת הדרים	משתלות הדרים
30	בהגמעה מתחת לטיפטוף והפעלה ע"י השקיה בטפטוף של כ-2 קוב לדונם <sup>(5)</sup> .	1.5	נמטודת פראטילנכוס	תפוח
-	למהול ב-250 סמ"ק מים לשתיל ולהגמיע	2.5 סמ"ק לשתיל בעציץ	נמטודת פראטילנכוס בשתילים בקרקע	משתלות תפוח

## הערות לטבלה:

(1) יישום בתיחוח: 10-15 ימים לפני זריעת/שתילת הגידול, יש לרסס ראגבי סופר על פני קרקע מתוחחת, בנפח תרסיס של לפחות 50 ליטר/ד', בפומיות זת-ז ובמינון המופיע בטבלה. אחר הריסוס, יש לתחח לעומק 15-20 ס"מ ולהפעיל בהשקיה של 30 קוב/ד', כך שכל חתך הקרקע המטופל יורטב.

(2) יישום בהגמעה:

< יש למהול את התכשיר במים ביחס של לפחות 1:800.

< ליישם רק בצמחים בטורגור מלא (צמחים רעננים שאינם מראים כל סימני צמאון) ולתת השקייה מלאה ו-2 קוב לדונם, עם סיום ההגמעה.

< המרווח בין הטיפולים יהיה לפי הצורך, אך לא פחות מחדשיים.



## ראגבי סופר RUGBY SUPER

< אין לטפל בראגבי סופר במצב עקה (בפרט עקת יובש וחום). יש לטפל בראגבי סופר בשתילים החל מחודש לאחר השתילה. יש להמנע ממגע התכשיר בנוף השתילים.  
 < פעילות התכשיר ארוכה בקרקע כבדה, ומתקצרת בקרקע קלה. במצע חול נקי הפעילות יורדת עקב הדחה מהירה של התכשיר מבית השורשים.  
 < במצע מנותק (טוף, פרלייט וכו') אין ליישם ראגבי סופר אלא לאחר בדיקה, יישום התכשיר על מספר צמחים קטן ומעקב אחר התפתחותם התקינה במשך שבוע. כדי להמנע מריכוז גבוה של התכשיר הפעיל במצע, יש להקפיד על המיהול המומלץ של התכשיר, ועל השקייה מלאה בסיום ההגמעה.

(3) בעגבניה יש ליישם ראגבי סופר רק לפני שתילה, ולא במצע מנותק. הזנים שנבדקו: 189, 819, 780, 580

(4) הזנים שנבדקו: היפרקום: "אקסלנט", "אלטום". גרברה: "זיגריד", "דיאנה", "תומס", "אימפרור". אסקלפיאס: "טוברוזה". ליזיאנטוס: "מריאצי", "רויאל וילט", "אקו לבן". סולידאגו: "דורו", "טרה". פרח שעווה: "אופיר", "סגול".

בזנים או מינים שאינם מופיעים בתוית, יש לבצע בדיקה פיטוטוקסית בהיקף מצומצם לפני השימוש בראגבי סופר.

(5) לפני הטיפול יש לבצע בדיקת קרקע ושורשים לאבחון מיני נמטודות ורמת האילוח. באפרסק, נקטרינה, תפוח וכרם היישום יבוצע בשתילים צעירים משתילה עד ניבה. במטעים מומלץ בד"כ לבצע שני יישומים, בראשית הקיץ ובסופו. כמו כן מומלץ לטפל במטע צעיר עם איתור ראשוני של הנזק.

### שילובים

יישום ראגבי סופר שלושה ימים או יותר לאחר יישום תכשירי מתאם סודיום, בטוח לגידול ומשפר את הדברת הנמטודות. בהעדד מידע על שילובים אין לשלב ראגבי סופר עם תכשיר כלשהו. כמו כן אין ליישם ראגבי סופר שבועיים לפני או שבועיים אחרי טפול קרקע עם תכשיר אחר, למעט מתאם סודיום.

