

118mm

117mm



Rufast



## רופאסט®

روفاست

### תחליב שמן במים

#### קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים

**התכולה:** 75 גרם Acrinathrin בליטר.

**כללי:** רופאסט שייך לקבוצת הפירטרואידיים ופעיל נגד החרקים במגע ובבליעה.

**הדברת תריס קליפורני:** התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריס הקליפורני כאחד, אך כדי להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות קטנות אל המזיק היושב בפרחים.

**הדברת חיפושית קליפה:** רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים באביב, וכן מונע את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.

**הדברת ציקדה ירוקה:** ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר צימוח נורמלי של הענפונים הצעירים.

**הדברת פסילת האגס:** רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים ובחיקי שושנות עלים.

**הדברת עשים:** רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשים.

מיוצר ע"י כמינובה, דנמרק  
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 97/הצ/1476.

התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ,  
ת.ד. 50369, תל אביב 6150301

**דרגת רעילות:** מסוכן (דרגה IV)  
**מספר או"ם:** 3082

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה  
Batch No: Printed on packing

**נער היטב לפני השימוש**

לא לשימוש ביתי . לשימוש חקלאי בלבד!  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

ليس للاستعمال المنزلي!  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

**Net content:** Printed on packing

**תכולה:** ראה מודפס על האריזה

**Label updating:** July 2016

**עדכון תווית:** יולי 2016

© רופאסט הוא שם רשום של חברת כמינובה, דנמרק 

## לוכסמבורג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 | [www.luxembourg.co.il](http://www.luxembourg.co.il)



111-4/617

140mm

131mm

117mm

### הוראות השימוש:

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
פרח שעווה <sup>(1)</sup>	תריפס קליפורני	60 סמ"ק/ד' בנפח נמוך או 0.06% בנפח מעל 100 ליטר/ד'	בשטח גלוי	-
ורד <sup>(2)</sup> , פלוקס, אסתר, סולידגו, חרצית, ציפורן, אסקלפיאס	תריפס קליפורני	80-60 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 100-25 ליטר/ד' או בריכוז 0.06%-0.08% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ליטר/ד'	בשטח הגלוי והחשוני	-
				3
גזר	פסילת הגזר	60 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 15-30 ליטר/ד'	ראה הערה (3)	21
אגס ספדונה, קוסטיה	פסילת האגס	0.07% (70 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס)	דרוש כיסוי מושלם של העלווה כולל בצמרות העצים	7
אפרסמון	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	0.06% בריסוס נגירה	להדברת ציקדות	14
	משפחת הציקדיתיים (ציקדות), כחליל הרימון, עש התפוח המדומה		במהלך הקיץ. דרוש כיסוי מושלם של העלווה	7

140mm

### אזהרות: התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס הגן על גופך בבגדים מתאימים. לבש בגדים עם שרוולים ארוכים, כפפות, משקפי מגן או מגן פנים עם מסכת נשימה תקינה. אין לשאוף את אדי התכשיר או את התרסיס. התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה, ולכן יש להרחיק בני אדם מהאזור המרוסס ולמנוע חשיפתם לתכשיר או לתרסיס. אין לרסס את התכשיר על חלקי גוף גלויים, ויש למנוע מגע התכשיר בעור ובעיניים. אין לנקות פומיות סתומות בנשיפת פה. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. אין לרסס כאשר נושבת רוח. אין לרסס בשעות החמות של היום. מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל לדגים ולדבורים. אין לרסס בזמן של פעילות דבורים בשטח. מרססים בשעות החשיכה, בשעות בהן הדבורים אינן פעילות. כוורות הנמצאות בסמוך לחלקה המרוססת סוגרים בעת הריסוס. כוורת של דבורי בומבוס יש להוציא מהחממה לפני הריסוס ברופאסט ולהחזירן 36 שעות לאחר הריסוס. יש לאוורר את חלל בית הצמיחה לפני החזרת הכוורות.

**הכנת התרסיס:** ממלאים תחילה את המרסס במחצית כמות המים הדרושה, מנערים את האריזה, מודדים את הכמות הדרושה של רופאסט ושמים בכלי נפרד, מוסיפים מעט מים ומערבבים היטב. מפעילים את מערבל המרסס ושופכים פנימה את תחליב התכשיר תוך השלמת כמות המים החסרה.

**הוראות השימוש:** רופאסט ניתן לשימה בכלי הריסוס המומלצים, במרסס מפוח ובמרססי רובים. אין ליישם רופאסט במכשירי איווד. להשגת הדברה יעילה וכדי להימנע מפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים בתכשירי הדברה אחרים המורשים לכך ובמרווחי הריסוס המומלצים. **מומלץ לא להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה.**

117mm

131mm

### המשך הוראות שימוש:

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
גלעיניים, נקטרינה, שזיף	תריפס קליפורני	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס) בנפח תרסיס המבטיח כיסוי נאות, וחדירה אל הפרחים הפתוחים	מועד הטיפול - בתקופת הפריחה בהתאם להמלצות	
נקטרינה, שזיף, משמש, שקד, אפרסק, שקד	קמבית השקד (חיפושית קליפה), ציקדה ירוקה	0.06% יש לדאוג לכיסוי נאות של הגזע, הענפים ואמירי הצימוח בהתאם למקום הימצאות המזיק	מהאביב עד הסתיו	7
שקד	עש המשמש (אנרסיה), עשנור החרוב (עש חרוב)		טיפולים קייצים בהתאם להמלצות	
דובדבן	קמבית השקד (חיפושית קליפה), ציקדה ירוקה		מהאביב עד הסתיו	30
גפן	תריפס קליפורני, משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	0.06%	להדברת תריפסים בזמן פריחה. להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כסוי מושלם של העלווה והתפרחות.	8
זית	עשנור היסמין (עש היסמין)	0.06% בריסוס נגירה	להדברה קייצית בנטיעות צעירות	40

### הערות לטבלה:

- פרח שעווה מהזנים:** אורכיד, דלה, אופיר.
- ורד מהזנים:** אסקימו, אסטרה, ברקרול, ברונו, ביאנקה, גרנד גלה, דאלאס, ורסיליה, וייט-קדילק, ויואלדי, טוניקה, טיים לס, טקסט, למבדה, ליאונידס, ניקול, סימור, ספיר, סרפרייז, פברוט, פרופיטה, פרסט רד, רוויל, גולדן גייט, גז, פרסקו, מרצדס, אירופה, רודאו, גבריאלה.
- יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.

**הערה:** כדי להימנע מפיתוח תנגודת וכדי להימנע מתופעת עידוד אקריות, מומלץ לנקוט במדיניות של ריסוסים חלופיים, בתכשירים מומלצים בעלי מנגנון פעולה שונה, ולהימנע ממתן טיפולים עוקבים באותו תכשיר.

**שילובים:** ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתוית שלהם: **במלפפון** - קומודור, קוסמוס.

**בשקד** - פריורי אקסטרה, פליקטרן.

**בגפן** - סרנייד, קנון, דומארק, הרקולס, פוליקור, אופיר, אביר.

**בפלפל** - סרנייד, אטמי אקסטרה, אטברון, גופריתר, מוספילן, אונוט, מץ', צ'ס, פרוקליים, אופיר, ביופילם, EOS.

**ברימון** - הרקולס.

**הערה:** יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירי ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

140mm

# מדבקה+מיקום הסיפרון על המדבקה

140mm

140mm



**Rufast** **רופאסט**

**תחליב שמן במים**  
**קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים**

**דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)**  
**מספר או"ם: 3082**

**נער היטב לפני השימוש**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריית בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר גמר העבודה, התרחץ היטב במים ובסבון והחלף בגדים. בגדי ריסוס מזהמים מסירים ומכבסים בנפרד משאר הכבסים.

**כניסה לשטח מטופל:** הכניסה לשטח מטופל מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות הגידול התרבותי. הכניסה לבתי צמיחה לאחר הטיפול מחייבת בנוסף את אזור חלל בית הצמיחה.

**איחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, כולל התווית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי האבסה, זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית. לתכשיר שנשפך או לתכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת פינוי לאתר פסולת רעילה.

**תכשיר שנשפך:** ספוג בנסורת או בחול. לאחר מכן אסוף לכלי סגור ופנה לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפים אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

**עזרה ראשונה:** • במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף בזרם חלש של מים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולהימנע בהשגחה רפואית. • במקרה של זיהום **העור**, רוחצים מיד את המקום המזוהם במים ובסבון. • במקרה של **שאיפת** אדי התכשיר יש להעביר את הנפגע לאוויר הצח. • במקרה של **בליעה** אין לגרום להקאה. יש לשטוף את הפה במים ולפנות לעזרה רפואית.

**מידע לחופא:** מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-8541900.

**לוכסמבורג תעשיות בע"מ**

111-4/617 [www.luxembourg.co.il](http://www.luxembourg.co.il) טל: 03-796 4300

